

# Communiqué d'informations réglementaires et techniques Flavescence dorée / Foyer Rhône N°1 du 21/05/2025

Toutes les informations régionales relatives à la flavescence dorée sont consultables sur le site :

<http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree-de-la-vigne>

Les zones de traitement et de prospection sont consultables et téléchargeables sur

[https://carto.open-datara.fr/1/carte\\_flavescence\\_doree\\_2025.map](https://carto.open-datara.fr/1/carte_flavescence_doree_2025.map)

Pour toute demande de renseignement : écrire à l'adresse :

[gestion-mo.sral.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr](mailto:gestion-mo.sral.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr)

**Le nombre de ceps atteint par la flavescence dorée dans le bassin viticole du beaujolais est quasiment stable en 2025 par rapport à 2024 malgré l'apparition de nouveaux foyers sur les communes de Chasselay, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Orniénas et Taluyers.**

Les premières larves ont été observées le 12/05/2025 à Morancé, et le 14/05/2025 à Belleville en Beaujolais.

**Attention, les dates du T3 sont données à titre indicatif** et sont susceptibles d'être modifiées en fonction du contexte climatique. En cas de modification, un deuxième bulletin rectificatif **sera publié sur le site de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes en cas de modification.**

## Détermination des stratégies de lutte

La lutte contre le vecteur de la flavescence dorée de la vigne est basée sur la réalisation de 3 traitements insecticides : deux traitements larvicides et un traitement adulticide. Depuis 2005, la lutte antivectorielle est « raisonnée », aménagée **afin de réduire son impact environnemental et économique** sur la base d'une analyse de risque qui prend en compte les données de suivi biologique du vecteur, la présence et l'importance des foyers, le niveau de surveillance du vignoble, l'exhaustivité des arrachages de souches contaminées et la bonne réalisation de la lutte insecticide au cours de la campagne précédente.

## Dates des traitements obligatoires 2025

Le nombre de traitements à effectuer est détaillé pour chaque commune de la zone délimitée en pages 5 et 6 et aussi sur la carte à l'adresse suivante :

[https://carto.open-datara.fr/1/carte\\_flavescence\\_doree\\_2025.map](https://carto.open-datara.fr/1/carte_flavescence_doree_2025.map)

Le nombre de traitements par référence cadastrale est consultable et téléchargeable à l'adresse suivante :

<https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/liste-des-parcelles-cadastrales-2025-avec-le-nombre-de-traitement-insecticide-a-a6147.html>

**Attention : Les produits doivent être utilisés à la dose maximale autorisée. Aucune diminution de dose n'est autorisée dans ce cadre.**

périodes de traitement	Lutte conventionnelle		Lutte biologique	
	vignes mères et zones 2 ou 3 Traitements	Zone à 1 traitement	zone à 2 ou 3 Traitements*	Zone à 1 traitement*
début T1	Jeudi 05/06/2025	Jeudi 12/06/2025	Jeudi 05/06/2025	Jeudi 12/06/2025
fin T1	Jeudi 12/06/2025	Jeudi 19/06/2025	Vendredi 13/06/2025	Vendredi 20/06/2025
début T2	Jeudi 19/06/2025		Vendredi 13/06/2025	Vendredi 20/06/2025
fin T2	Jeudi 26/06/2025		Samedi 21/06/2025	Samedi 28/06/2025
début T3	Samedi 19/07/2025		Samedi 21/06/2025	
fin T3	Samedi 26/07/2025		Dimanche 29/06/2025	

\* **Agriculture biologique** : la lutte devra comprendre au moins 2 traitements lorsque la zone est classée 1 traitement et 3 traitements lorsque la zone est classée 2 ou 3 traitements.

Pour une bonne efficacité du PYREVERT<sup>®</sup>, il est souhaitable de respecter les précautions suivantes :

- Epamprage des vignes avant le traitement
- Très bonne qualité de la pulvérisation

Il est impératif de **contrôler l'efficacité des traitements 7 jours après application**. En cas de populations larvaires supérieures à 2 cicadelles/100 feuilles, renouveler la protection dans la limite de 3 traitements maximum/an. **Si le contrôle après traitement ne peut être réalisé, renouveler l'application à 10 jours d'intervalle.**

Concernant les produits à base d'huile de paraffine type LUMIERE<sup>®</sup>, qui ont également une Autorisation de Mise sur le Marché pour l'usage Cicadelles de la Flavescence dorée sur vigne, leurs conditions d'utilisation, en particulier le nombre maximum d'applications (3 applications) et les stades d'application (entre BBCH 53 et 91) sont compatibles avec les périodes des traitements obligatoires définies par les arrêtés préfectoraux.

Cependant, compte tenu des éléments dont nous disposons à ce jour sur le comportement du produit LUMIERE<sup>®</sup>, nous recommandons les utilisations suivantes :

- Zones à un traitement obligatoire : **nous conseillons l'utilisation d'un produit à base de pyrèthre naturel (PYREVERT<sup>®</sup>).**
- Zones à 2 ou 3 traitements obligatoires : une application du produit LUMIERE est envisageable au début des périodes définies par les arrêtés préfectoraux de traitement obligatoire (meilleure efficacité du produit sur les jeunes stades larvaires). Nous recommandons de réaliser le ou les traitements suivants avec une autre spécialité commerciale à base de pyrèthre naturel.

### **Vignes mères et pépinières :**

Dans le cas d'utilisation du PYREVERT®, celui-ci ne pouvant être appliqué qu'en phase larvaire, il ne peut respecter la couverture insecticide exigée par l'article 16 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021. Son utilisation entraîne donc l'exigence d'un traitement à l'eau chaude pour les plants ou pour les boutures de greffons de la campagne en cours, et pour les boutures de porte-greffe, durant toute la durée de production de la vigne-mère.

**Les produits à base indoxacarbe ou d'huile essentielle d'orange ne sont pas efficaces pour lutter contre la cicadelle vectrice, ils ne doivent pas être utilisés seuls dans le cadre de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée.**

## **Modalités de la lutte contre le vecteur**

Toutes les vignes doivent être protégées, y compris les plantiers !

**Respecter la réglementation** sur les mélanges et les modalités d'utilisation des produits phytosanitaires telles que prévues par l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Utiliser des produits autorisés pour cet usage dont la liste est consultable sur: <https://ephy.anses.fr/> (Usage : Vigne\*Trt Part.Aer.\*Cicadelles ).

### **Attention aux produits à base :**



- de Kaolin, de silicate d'aluminium ou d'indoxacarbe qui ne sont pas efficaces pour lutter contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée
  - d'huile essentielle d'orange douce dont l'efficacité n'a pas été démontrée.
- Ces produits ne peuvent être utilisés dans le cadre de la lutte obligatoire contre *Scaphoideus titanus*.

## **Vignes mères et pépinières viticoles.**

### **Vignes mères des Zones Délimitées :**

Trois traitements doivent être réalisées, pour couvrir les stades larvaires et adultes de l'insecte vecteur selon le calendrier figurant en page 1

En cas de défaut de traitement les boutures de greffons devront être traitées à l'eau chaude pour la campagne de production, et les boutures de porte-greffe pendant toute la durée de production de la vigne mère.

**En agriculture biologique**, le PYREVERT® ou le LUMIERE® ne permettant pas de lutter contre les stades adultes, les boutures issues de vignes mères traitées avec ces spécialités commerciales devront subir un traitement à l'eau chaude.

### **Pépinières des Zones Délimitées :**

La protection insecticide doit être assurée entre le 15 mai et le 15 octobre. Les traitements sont à renouveler tous les 14 jours.

Tout défaut de traitement entraînera une obligation de traitement à l'eau chaude des plants

### **Vignes mères et pépinières des Zones Exemptes de flavescence dorée.**

La lutte contre le vecteur de la flavescence dorée peut être remplacée par un traitement à l'eau chaude des boutures issues des vignes-mères ou des plants issus des pépinières viticoles.

## Efficacité des traitements

**Epampez** juste avant les traitements et utilisez du matériel de pulvérisation bien réglé.

### Vérifiez l'efficacité du traitement

Chaque vigneron est responsable de la lutte antivectorielle de ses parcelles et doit s'assurer de son efficacité :

- Vérifiez l'efficacité du traitement en fin de rémanence du produit
- En cas de dépassement du seuil de 2 larves/100 feuilles renouveler la protection dans la limite du nombre maximal d'application autorisé par l'AMM du produit utilisé ou employer un autre produit.

## Limiter la dissémination par le matériel agricole:

Afin de limiter ce risque, il est préférable de commencer les opérations d'écimage par les parcelles indemnes en les terminant par les parcelles contaminées et de nettoyer les lames des écimeuses avant de quitter la parcelle.

## Distance minimale de sécurité

En application de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, en l'absence de distance de sécurité de non traitement spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, les distances minimales de sécurité au voisinage des lieux mentionnés à l'article L.253-7-1 et au III de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à **3 mètres**.

Cette liste est régulièrement actualisée et doit être consultée lors de tout achat de produit phytosanitaire.

## Zone de non traitement

Par dérogation prévue par l'article 12 de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, la distance de non-traitement en limite des points d'eau est fixée à **3 mètres**.

(liste publiée au B.O. du Ministère chargé de l'agriculture.

## Protection des pollinisateurs : une nouveauté réglementaire

Une décision du Conseil d'Etat du 26 avril 2024 annule la liste des espèces qui étaient considérées comme non attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs (dont faisait partie la vigne).

En conséquence les conditions de l'arrêté du 21 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs s'appliquent pleinement à la vigne.

En revanche, conformément à l'article 12 bis de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, pour les produits non autorisés pendant la floraison (Spe8) et sans alternative possible (cas en agriculture biologique) :

- L'application pourra être effectuée sur les vignes en floraison dans le cadre de la lutte obligatoire contre le vecteur de la flavescence dorée. Les produits sont appliqués dans les mêmes conditions que les produits avec la mention abeille, comme indiqué ci-dessous :

Pour les produits autorisés pendant la floraison, il est nécessaire de respecter les points suivants :

- Sur vigne en fleur :
  - Traitement uniquement 2h avant ou 3h après le coucher du soleil.




- Sur la zone de butinage :
  - Tonte ou fauchage des couverts pour les rendre non attractifs

Dans tous les cas, il est interdit de traiter en présence des abeilles, même si le produit comporte la « mention abeilles » ou est réalisé dans le cadre de l'article 12 bis de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur.

Les mélanges extemporanés de pyréthriinoïdes avec triazoles/imidazoles sont interdits en période de floraison et d'exsudation (Respecter un délai de 24 heures entre les applications en commençant par le produit à base de pyréthriinoïdes.).

**FLAVESCENCE DOREES & ZONES DELIMITEES & ZONES DE TRAITEMENT 2025**

Auvergne-Rhône-Alpes – Département : Rhône – Secteur Nord



**Zonages réglementaires**  
 Périmètre zone délimitée  
 Zone 0 traitement  
 Zone 1 traitement  
 Zone 2 traitements  
 Zone 3 traitements


**Limites administratives**  
 Région  
 Département  
 Commune

0 2 4 km

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  
 Service régional de l'alimentation  
 Plan qualité et protection des végétaux  
 09 avril 2025  
 Sources : DRAAF AuRA 2025  
 Références : fond carte : IGN administratif 2025, BD Cartho 2024

**FLAVESCENCE DOREES & ZONES DELIMITEES & ZONES DE TRAITEMENT 2025**

Auvergne-Rhône-Alpes – Département : Rhône – Secteur centre



**Zonages réglementaires**  
 Périmètre zone délimitée  
 Zone 0 traitement  
 Zone 1 traitement  
 Zone 2 traitements  
 Zone 3 traitements


**Limites administratives**  
 Région  
 Département  
 Commune

0 2 4 km

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  
 Service régional de l'alimentation  
 Plan qualité et protection des végétaux  
 09 avril 2025  
 Sources : DRAAF AuRA 2025  
 Références : fond carte : IGN administratif 2025, BD Cartho 2024

**FLAVESCENCE DOREES & ZONES DELIMITEES & ZONES DE TRAITEMENT 2025**

Auvergne-Rhône-Alpes – Département : Rhône – Secteur Sud



**Zonages réglementaires**  
 Périmètre zone délimitée  
 Zone 0 traitement  
 Zone 1 traitement  
 Zone 2 traitements  
 Zone 3 traitements

**Limites administratives**  
 Région  
 Département  
 Commune

0 2 4 km

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  
 Service régional de l'alimentation  
 Plan qualité et protection des végétaux  
 09 avril 2025  
 Sources : DRAAF AuRA 2025  
 Références : fond carte : IGN administratif 2025, BD Cartho 2024

## Communes en zone délimitée 2025 concernées par des traitements insecticides pour la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée

Commune	Nombre de traitements insecticides*
Alix	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Anse	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Arnas	Zone 2 traitements
Bagnols	0 ou 1 traitements selon la zone de la commune
Beaujeu	2 ou 3 traitements selon la zone de la commune
Belleville-en-Beaujolais	Zone 2 traitements
Belmont-d'Azergues	Zone 2 traitements
Blacé	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Bully	Zone 3 traitements
Cercié	Zone 3 traitements
Chamelet	Zone 2 traitements
Charentay	Zone 2 traitements
Charnay	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Chasselay	Zone 2 traitements
Châtillon	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Chazay-d'Azergues	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Chénas	Zone 3 traitements
Chessy	Zone 1 traitement
Chiroubles	2 ou 3 traitements selon la zone de la commune
Cogny	0 ou 1 traitements selon la zone de la commune
Corcelles-en-Beaujolais	Zone 2 traitements
Denicé	0 ou 1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Émeringes	Zone 2 traitements
Éveux	Zone 2 traitements
Fleurie	Zone 3 traitements
Fleurieux-sur-l'Arbresle	Zone 2 traitements
Frontenas	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Gleizé	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Juliéas	Zone 3 traitements
Jullié	Zone 3 traitements
Lacenas	0 ou 1 traitements selon la zone de la commune
Lachassagne	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Lancié	Zone 2 traitements
Lantignié	2 ou 3 traitements selon la zone de la commune
Le Breuil	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Le Perréon	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Légnay	Zone 1 traitement
Les Ardillats	Zone 2 traitements
Létra	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Lissieu	Zone 2 traitements
Lozanne	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Lucenay	Zone 0 traitement
Lurcy	Zone 2 traitements
Marchampt	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune

Commune	Nombre de traitements insecticides*
Marcilly-d'Azergues	Zone 2 traitements
Marcy	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Moiré	Zone 0 traitement
Montmelas-Saint-Sorlin	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Morancé	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Odenas	Zone 2 traitements
Orliénas	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Pommiers	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Porte des Pierres Dorées	0 ou 1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Quincié-en-Beaujolais	Zone 3 traitements
Régnié-Durette	Zone 3 traitements
Rivolet	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Sainte-Paule	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Saint-Étienne-des-Oullières	2 ou 3 traitements selon la zone de la commune
Saint-Étienne-la-Varenne	2 ou 3 traitements selon la zone de la commune
Saint-Georges-de-Reneins	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Saint-Germain-Nuelles	Zone 2 traitements
Saint-Jean-des-Vignes	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Saint-Julien	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Saint-Lager	Zone 3 traitements
Saint-Laurent-d'Agny	Zone 2 traitements
Saint-Vérand	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais	Zone 2 traitements
Sarcey	Zone 2 traitements
Taluyers	Zone 2 traitements
Ternand	1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Theizé	0 ou 1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Val d'Oingt	0 ou 1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Vaux-en-Beaujolais	0 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Vauxrenard	Zone 2 traitements
Ville-sur-Jarnioux	0 ou 1 ou 2 traitements selon la zone de la commune
Villié-Morgon	2 ou 3 traitements selon la zone de la commune
Vindry-sur-Turdine	Zone 1 traitement

\* Nb sur vignes conventionnelles. En AB : + 1 traitement en zone 1 traitement et 2 traitements.